



いわや通信

スマイル



B型肝炎(HB)ワクチン を すべてのお子さまに

ザ・病気



HBウイルスはキャリアー(保菌者)の血液や精液だけでなく、汗、唾液、涙、尿にも存在し、眼に見えないような皮膚や粘膜の傷から感染します。特に3歳未満で感染したり、最近海外から持ち込まれた遺伝子型Aタイプによる感染ではキャリアー

になりやすく、キャリアーからは肝硬変や肝ガンを発症します。全世界では3億5千万人がキャリアーだと推定されており、わが国では約130~150万人がキャリアーで、約10万人が慢性肝炎や肝硬変、肝ガンで苦しんでおられます。

主な感染経路の一つは、キャリアーである母親から出産のときにおこ

る母子垂直感染です。キャリアーであるお母さんから生まれた赤ちゃんには出生直後から免疫グロブリンやワクチンを接種する予防法が1985年から始まり、わが国の母子感染率は今では1/10に減少しました。ところが生まれた後に父親やおばあちゃん、おじいちゃんから感染する家族内感染や保育園での感染など、水平感染は減少していません。また性行為で感染すると劇症肝炎を発症したりキャリアー化してしまうことが大変問題になっています。


世界では実に90%以上の子供たちがHBワクチンを接種されています。日本では任意接種ですので(2013年夏現在)費用がかかりますが、生後2ヶ月から始められ、年齢の制限はありません。子どもの方が大人よりも高い免疫が得られやすく、またキャリアーになりやすいので、3歳未満でできるだけ早く免疫をつけてください。4週間隔で2回接種し、さらに20~24週後に3回目をうけましょう。2~3日前にお電話で予約をしてください。

***費用は1回 6,000円+消費税 です。**

院長 岩屋 美奈子

ワクチンのお知らせ

昨年引き続きインフルエンザワクチン予約システムのご利用が可能です。また予約なしでの受付順でも接種ができます。インターネット予約をご利用に当たっての注意点



インフルエンザワクチン接種を
10月22日(火曜)
から開始します!

- ・料金は1回3150円となります。
- ・13歳未満のお子様は、初回接種から2~4週(3週間あけてが望ましい)間隔で2回の接種が必要です。
- ・卵アレルギーのある方は専門病院でご相談ください。
- ・予約時間の10分前にお越しください。20分以上遅れて来院された場合はキャンセルとさせていただきます。
- ・6ヶ月以上1歳未満の方で、接種をご希望の方は医師にご相談ください。
- ・診察も兼ねて、接種をご希望の方は、このシステムでの予約はできません。通常通り、外来での受付順となりますのでご了承ください。
- ・ご両親も一緒に、予約接種できます。

知っておきたい豆知識

【上手な薬の飲ませ方】



《シロップ剤を飲ませるとき》

- ①おちょこなどの小さな容器に入れて飲ませる。
- ②スプーンで少しずつ、なるべく口の奥の方へ入れて飲ませる。
- ③スプーンを嫌がったり、月齢の低い赤ちゃんはスポイドで飲ませる。
- ④哺乳瓶を使う赤ちゃんでは、哺乳瓶の乳首にシロップを入れて吸わせるのも良い方法です。

《粉薬を飲ませるとき》

- ①ジュースやヨーグルト、お薬ゼリー(服薬補助ゼリー)などに混ぜて飲ませる。アイスクリームなどの冷たいものに混ぜると味を感じにくく飲みやすくなります。

- ②少量の水で粉薬を練ってきれいな指先につけ、子供のの上あごや頬の内側に塗る。

《錠剤を飲ませるとき》

- ①舌を湿らせるために、まず一口水を飲ませます。次に錠剤をできるだけ舌の奥の方にのせて、水といっしょに飲ませる。
 - ②錠剤と水を口に入れた後、下を向きお辞儀をする姿勢で飲ませてみましょう。
- *水なしで飲める錠剤も出てますが、それ以外は必ず水といっしょに飲ませましょう。水なしで飲むと食道に炎症を起こすこともあります。



スタッフ紹介

郷原 和美

- 血液型...A型
- 星座...ふたご座
- 趣味...
- ベリーダンス
- ジャザサイズ



昨年沖縄から引っ越ししてきました。食べ物が美味しく、住みやすい福岡で、9歳と5歳の男の子の子育てに日々奮闘中です。皆様の不安を少しでも和らげることができるよう、サポートしていけたらと思っています。よろしくお祈りします。

いわや小児科クリニック

<http://iwaya-clinic.jp/>

〒819-0006 福岡県福岡市西区姪浜駅南 2-1-37
メディカルビル・竹下 2F (ウエストコート姪浜前)
TEL:092-892-1585