




キャンピロバクター腸炎



キャンピロバクターという病原体は、ニワトリや家畜が腸管内に持っており、これらの動物の排泄物で汚染された肉や水、また手指や調理器具などを介して汚染された食品を摂取して経口感染をおこします。8割の患者さんが鶏肉による感染で、日本の鶏肉の20～40%がキャンピロバクターに汚染されているともいわれています。抵抗力の弱い乳幼児が発症しやすい病気です。

潜伏期間は2～5日間で、発熱や頭痛、腹痛、下痢が始まります。嘔吐がなく、血便が5割の頻度で生じることが特徴です。



焼き鳥屋やバーベキューなどで加熱不十分な鶏肉を家族みなで食べ、同じものを食べているのに子供だけ発病することがよくあります。便の培養検査の結果、数日後に診断がつけば、抗生剤を5日間ほど内服してください。速やかに、症状も排菌も消失します。自然に治癒していくこともありますが、無治療だと1～2,3週間下痢が続き、便の中への排菌は、2～7週間も続きます。合併症として、ギランバレー症候群という、下肢から脱力が始まり、次第に全身の筋肉がマヒしていく病気があります。20%に神経後遺症を残す重篤な病気です。

日本脳炎ワクチンのお知らせ

特例措置が追加になりました！！

※平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方は、7才6ヵ月までに第1期の2回分と追加1回分の計3回分の接種が完了していない場合、未接種(残り回数)分を9才から13才未満の間に定期予防接種として接種ができます。

※平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方は、20才になるまで、4回接種ができます。

詳細は母子手帳をもって、ご相談ください

知っておきたい豆知識

食中毒の予防対策



※食肉は十分に加熱(中心部を75℃以上、1分間以上)調理を行いましょう。

※生の食肉に使用した調理器具は、他の食材に触れないようにしましょう。

殺菌の仕方

☆熱湯

熱湯で5分間煮沸、又は器具にゆっくりと熱湯をかけます。

☆漂白剤(ハイター)

特にまな板は、漂白剤を染み込ませた布巾をかぶせてバックします。(10分～30分)

スタッフ紹介



看護師 前野 浩美

中学生の娘と小学生の息子がいます。患者さまに丁寧に、親切に接することを心がけております。よろしくお願いいたします。

血液型：A型
趣味：読書

いわや小児科クリニック

福岡県福岡市西区姪浜駅南 2-1-37 メディカルビル・竹下 2F (TEL) 092-892-1585

HOME PAGE <http://www.iwaya-clinic.jp/> ●MAIL info@iwaya-clinic.jp